


КАК СДЕЛАТЬ ПОДКОЖНУЮ ИНЬЕКЦИЮ?

Подготовка к проведению подкожной инъекции

1. Тщательно вымыть руки.
2. Достать препарат из холодильника, затем извлечь из картонной пачки и ячейковой упаковки шприцы и положить на чистую поверхность. Убедиться, что срок хранения препарата, указанный на картонной пачке и шприце, не истек.
3. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применения (некоторые препараты следует довести до комнатной температуры, для этого необходимо оставить шприц при комнатной температуре в течение приблизительно 25-30 минут. Не следует согревать шприц каким-либо другим способом).
4. Подготовить салфетку/ватный тампон, спиртовой раствор.



Рекомендации по выбору места инъекции


- Места инъекций и стороны следует менять с каждой последующей процедурой инъекции. Расстояние между двумя введениями должно составлять как минимум 5 см.
- Нельзя вводить препарат в место на коже, где имеется болезненность, покраснение, уплотнение или кровоподтек (эти признаки могут указывать на наличие инфекции). По возможности не следует вводить препарат в псориатическую бляшку.
На данном этапе не следует снимать колпачок шприца.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДКОЖНОЙ ИНЬЕКЦИИ ПРЕПАРАТА В ПРЕДНАПОЛНЕННОМ ШПРИЦЕ

Выбор и подготовка места для инъекции


Выберите место инъекции (передняя брюшная стенка (отступая не менее 5 см от пупка), передняя и боковая поверхность бедра или средняя третья наружной части плеча) и обработайте кожу в области введения спиртовой салфеткой.

Шприц не встряхивать.



Инъекция

1. Снимите колпачок с иглы, не дотрагиваясь до иглы и избегая ее прикосновения к другим поверхностям.
2. Большими и указательным пальцами одной руки возьмите в складку обработанную кожу.
3. В другую руку возьмите шприц, держа его градуированной поверхностью вверх.
4. Введение препарата необходимо осуществлять под углом 45° или 90° к поверхности кожи в зависимости от толщины кожи и выраженности подкожно-жирового слоя (у худощавых пациентов введение препарата осуществляется под углом 45°, у пациентов с толщиной кожной складки более 1,5 см допустимо введение под углом 90°).
5. Одним быстрым движением полностью введите иглу в кожную складку. После введения иглы отпустите складку кожи.
6. Ведите весь раствор медленным постоянным надавливанием на поршень шприца в течение 2-5 секунд.
7. Когда шприц будет пустым, выньте иглу из кожи под тем же углом.



После инъекции

Сухой стерильной салфеткой/ватным тампоном слегка прижать область инъекции, но не растирать область выполненной инъекции. Из места инъекции может выделиться небольшое количество крови. При необходимости можно воспользоваться пластырем.

Согласно инструкции по медицинскому применению введите вторую дозу препарата аналогичным образом предпочтительно в ту же анатомическую область при условии, что место последующей инъекции должно быть не ближе 5 см от предыдущей. Время выполнения двух инъекций не должно превышать 10 минут.

После инъекции шприц повторно не использовать.